ALLERGIE ALIMENTARI: L'APPROCCIO INTEGRATO TRA NUTRIZIONE E MEDICINA DI PRECISIONE

Dott.ssa Sara Rurgo

Medico Chirurgo – Specialista in Scienze dell’Alimentazione – Università Federico II di Napoli
Comitato Scientifico ASIPAN – Associazione Italiana Pazienti Allergici al Nichel

Allergia o Intolleranza?

Intolleranze alimentari

(NON immuno-mediate)

- Intolleranza al lattosio
- Sensibilità al glutine
- Intolleranza ai FODMAP
- Intolleranza all'istamina

Allergie

(Immuno-mediate)

- Proteine alimentari –uovo, latte, pesce, crostacei...
- Nichel
- Celiachia

- Sintomi prevalenti: dolore addominale, gonfiore, distensione addominale, flatulenza e diarrea
- Sintomi meno comuni: mal di testa ed emicrania, affaticamento, dolori muscolari → *overlap con sintomi di IBS e fibromialgia*
- Gravità dei sintomi è dose-dipendente

- Sintomi gastrointestinali, cutanei o respiratori fino all'anafilassi.
- Gravità dei sintomi non è dose-dipendente e l'insorgenza avviene subito dopo l'esposizione

«Leaky gut syndrome»

Intolleranza al lattosio

Dieta a basso contenuto di lattosio, Prodotti Fermentati e Probiotici

La gestione include la restrizione dietetica del lattosio ma NON l'evitamento

Strategia → indurre un adattamento o tolleranza batterica attraverso l'utilizzo di **prebiotici** e consumo regolare di **prodotti contenenti lattosio in piccola quantità**

il lattosio può servire da substrato per il microbiota → stimolare la crescita dei batteri che lo digeriscono

Lattasi esogena

1 compressa 40 minuti prima del pasto contenente lattosio

Nutrigenomico a base di *Lactobacillus Paracasei subsp. Paracasei F19*

- Aumenta la capacità idrolitica della flora intestinale
- Antagonizza i batteri produttori di gas
- Regola la permeabilità della mucosa intestinale

Gluten-sensitivity

- Esiste la convinzione che il glutine possa generare i sintomi in alcuni pazienti
- La sensibilità al glutine non celiaca → presenza di sintomi gastrointestinali secondari all'ingestione di glutine che migliorano con una dieta priva di glutine in assenza di malattia celiaca (**sierologia, tipizzazione HLA e, se necessario, biopsia duodenale negativi**)
- Studi recenti hanno evidenziato come la presenza di altri componenti del frumento, in particolare **fruttani**, potrebbero essere responsabili dell'insorgenza dei sintomi

FODMAPs

FODMAP → piccoli **zuccheri scarsamente digeribili** che, una volta raggiunto il colon, creano **fermentazione** rapida che comporta **distensione** delle anse intestinali → **dolore e gonfiore**

La dieta Low-Fodmap è utile nella gestione della **Sindrome dell'Intestino Irritabile** abbinata ad integrazione specifica con **nutrigenomio e PEA** → effetti antidolorifici e antinfiammatori

Attenzione: Moderare il consumo di alimenti HI-FODMAP può essere di aiuto nelle fasi acute ma è importante la fase di reintroduzione graduale per evitare carenze nutrizionali ed alterazioni del microbioma intestinale

Allergia al Nichel

Evitare i cibi ad alto contenuto di nichel:

arachidi, fagioli, lenticchie, piselli, soia, avena, cacao, noci, nocciole e mandorle, farina integrale, pomodori, cipolle...

Evitare il cibo in scatola e le bevande in lattina:

Limitare i prodotti confezionati industriali

→ è impossibile eliminare completamente il nichel dalla dieta

→ il contenuto di nichel nel cibo è difficile da determinare:

caratteristiche del suolo, dell'acqua, dei fertilizzanti usati e perfino le stagioni ne influenzano e modificano il contenuto (ad esempio, in estate i vegetali presentano meno nichel rispetto all'inverno)

→ non esiste un valore di “dose massima” accettabile per tutti:

Strategie

- Consumare **cibi ricchi di vitamina C**, in grado di contrastare l'assorbimento del nichel a livello dell'intestino.

Tra gli alimenti a basso contenuto di nichel, gli agrumi (arancia, limone, mandarini, pompelmo ecc.) risultano essere ricchissimi di vitamina C.

- Utilizzare **alimenti ed integratori antiossidanti** per sfruttare il loro potere antiossidante e antinfiammatorio
- Evitare di incorrere in **anemia da carenza di ferro**, bilanciando bene l'assunzione con la dieta di questo minerale ed aumentandone l'assorbimento.

L'organismo in presenta carenza di ferro tende ad accumulare maggiori quantità il nichel

La **nutrigenetica** ha consentito l'identificazione di varianti genetiche associate alla **suscettibilità alle malattie** attraverso l'interazione con fattori dietetici, contribuendo alla prevenzione e al trattamento delle malattie croniche nell'ottica della **nutrizione e medicina di precisione**.

- Intolleranza genetica al lattosio
- Gluten Sensitivity
- Alterata sensibilità al Nichel
- Permeabilità Intestinale
- Obesità, Sindrome Metabolica

Grazie!

Dott.ssa Sara Rurgo

Medico Chirurgo – Specialista in Scienze dell’Alimentazione – Università Federico II di Napoli
Comitato Scientifico ASIPAN – Associazione Italiana Pazienti Allergici al Nichel

www.asipan.it

[asipan.allergici.nichel](https://www.asipan.allergici.nichel)